

Si riportano le indicazioni essenziali comunicate dal medico in occasione della formazione dei docenti e successivamente inviate ai docenti .

CRISI CONVULSIVA o EPILETTICA: COSA FARE?

- Essere consapevoli che le funzioni vitali restano integre (mantenere la calma!)
- La maggior parte delle crisi in bambini con epilessia o crisi febbrili non rappresenta una emergenza medica e termina da sola, senza danni, dopo 2-3 minuti
- Superati i 3-4 minuti la crisi deve essere interrotta
- Maggiore è il tempo trascorso dall'inizio della crisi, più difficile diventa interromperla, anche con i farmaci che si usano in PS
- Per crisi epilettica prolungata si intende la crisi di durata superiore ai 10-15 minuti.
- Solo una crisi epilettica **molto** prolungata può provocare complicanze cardio-respiratorie e neurologiche

Se possibile, coinvolgere 3 persone

- **una persona** per i contatti telefonici e le annotazioni:
 - chiama il 118 e prende nota delle eventuali indicazioni ricevute.
 - prende nota:
 - dell'attività che il bambino stava svolgendo all'esordio della crisi
 - dell'orario di inizio della crisi e della sua durata,
 - delle manifestazioni che gli insegnanti sono stati in grado di rilevare [es.: stato di coscienza, movimenti anomali (simmetrici o solo da un lato?), colorito della cute, modificazioni del respiro, modificazioni comportamentali e del linguaggio] durante la crisi e nei minuti successivi
 - informa i genitori

Una persona accudisce il bambino

- allontana dal bambino ogni oggetto pericoloso,
- lo posiziona in decubito laterale per evitare l'inalazione di saliva ed eventuale vomito
- appoggia qualcosa di morbido sotto la testa per evitare traumi
- favorisce l'estensione del capo
- slaccia eventuali capi di vestiario troppo stretti, soprattutto al collo




Una persona si attiva per somministrare il farmaco prescritto

- Reperisce rapidamente il farmaco

BUCCOLAN


- Procede alla somministrazione del farmaco dopo 3-4 minuti dall'inizio della crisi (salvo diversa indicazione del medico di famiglia)

FASE 1




Rimuovere il sigillo ed estrarre la siringa dal tubo;

FASE 2



Rimuovere il cappuccio rosso;

FASE 3



- Asciugare l'eventuale presenza di saliva;
- Inclinare la testa del bambino dal lato in cui si somministra il farmaco;
- Pizzicare la guancia tra indice e pollice, tirare indietro delicatamente;
- Inserire la punta della siringa tra la guancia e la gengiva inferiore;
- Somministrare lentamente metà dose da una parte e metà dose dall'altra, oppure in caso di rilevante scialorrea da un lato della bocca, somministrare l'intera dose nella guancia opposta;
- Durante la somministrazione è utile massaggiare la guancia per aumentare la superficie di assorbimento del farmaco.

NOME:..... COGNOME:..... CLASSE:..... A.S.

DATA	SITUAZIONE OSSERVATA	AZIONI EFFETTUATE (il farmaco si trova in bidelleria)	EVENTUALI NOTE	FIRMA
		somministrazione farmaco (indicare nome): Orario: ORARIO CHIAMATA 118:..... ORARIO CHIAMATA FAMIGLIA:.....		
		somministrazione farmaco (indicare nome): Orario: ORARIO CHIAMATA 118:..... ORARIO CHIAMATA FAMIGLIA:.....		
		somministrazione farmaco (indicare nome): Orario: ORARIO CHIAMATA 118:..... ORARIO CHIAMATA FAMIGLIA:.....		

